

1



SI PREGA DI BARRARE CON UN X SULLA LETTERA CORRISPONDENTE SENZA APPORRE ALTRI SEGNI; ALTRE INDICAZIONI (es Si, NO ..) o EVENTUALI CANCELLATURE NON VERRANNO CONSIDERATE

Si ricorda che risposte corrette verranno valutate 2 punti, le risposte lasciate in bianco 1 punto, le risposte sbagliare 0 punti

DOMANDE

- 1) L'incidenza statistica di suicidi è più elevata in individui che sono:
 - a) Genere maschile piuttosto che femminile
 - b) non coniugati piuttosto che divorziati
 - c) coniugati rispetto che vedovi
 - d) giovani rispetto che vecchi

- 2) in assenza di altri sintomi, lo sporadico manifestarsi di automatismi comportamentali e allucinazioni olfattive suggerisce una diagnosi di:
 - a) Disturbo istrionico di personalità
 - b) Psicosi schizofrenica
 - c) lesione del lobo temporale
 - d) Demenza di Alzheimer

- 3) Che cosa è la DUI?
 - a) Durata di malattia non trattata
 - b) Durata di psicosi non trattata
 - c) Psicosi da uso di sostanze
 - d) Disturbo da uso di sostanze

- 4) Si ritiene che la percentuale di madri che sviluppano la depressione post partum sia approssimativamente:
 - a) 0,5-1%
 - b) 10-15%
 - c) 25-30%
 - d) 35-40%

- 5) La ciclotimia si distingue dai disturbi Bipolare per:
 - a) la storia familiare
 - b) l'assenza di cronicità
 - c) la gravità e la durata dei sintomi
 - d) caratteristica personalità preesistente

- 6) La depressione e l'ansia con o senza attacchi di panico si manifestano in circa metà dei pazienti affetti da:
 - a) sindrome di Cushing
 - b) iponatriemia
 - c) iperglicemia
 - d) ipotiroidismo

- 7) Quali tra i seguenti farmaci antipsicotici presenta effetti anticolinergici più marcati?
 - a) Aloperidolo
 - b) Quetiapina
 - c) Olanzapina
 - d) Risperidone

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- 8) Quali dei seguenti farmaci presenta un elevato rischio di teratonicità se assunto in gravidanza?
- a) Sali di Litio
 - b) Valproato
 - c) Paliperidone Palmitato
 - d) Aloperidolo
- 9) Nella classificazione delle strutture residenziali psichiatriche elaborata nel 2014 dalla Conferenza Stato Regioni e recepita da Regione Liguria vengono definite come strutture socio-assistenziali psichiatriche:
- a) Le RSA e le CAUP
 - b) Le Comunità Terapeutiche
 - c) Le strutture residenziali Psichiatriche del tipo SPR1
 - d) Le strutture Residenziali Psichiatriche del tipo SPR3
- 10) Un ricovero in regime di Trattamento Sanitario Obbligatorio si effettua quando :
- a) è presente uno stato di necessità
 - b) c'è una richiesta motivata da parte di uno psichiatra della struttura pubblica
 - c) è stata emessa una ordinanza del Sindaco
 - d) è stata emessa una disposizione del Giudice Tutelare
- 11) Per quanto tempo è necessario effettuare un emocromo di controllo in soggetti in trattamento con Clozapina?
- a) 16 settimane
 - b) 18 settimane
 - c) 20 settimane
 - d) 20 settimane e poi una volta al mese sino a che dura il trattamento
- 12) Secondo i dati epidemiologici quale è la prevalenza stimata di disturbi depressivi nella popolazione generale?
- a) 1%
 - b) 3%
 - c) 7%
 - d) 10%
- 13) Quali tra le seguenti variabili non si correla ad un maggior rischio di comparsa di disturbi mentali gravi nelle fasce giovanili?
- a) Migrazione di I e II generazione
 - b) Abusi nell'infanzia
 - c) Familiarità psichiatrica
 - d) Genere
- 14) quale tipologia di pazienti psichiatrici vengono ricoverati nelle Residenze per l'Esecuzione di Misure di Sicurezza (REMS)?
- a) Soggetti incapaci di intendere e di volere
 - b) Soggetti imputabili e sottoposti a libertà vigilata
 - c) Soggetti non imputabili e sottoposti a misure di sicurezza
 - d) Soggetti imputabili sottoposti a misure di sicurezza
- 15) La nomina di un amministratore di sostegno per un paziente affetto da patologia psichiatrica può essere disposta dal Giudice Tutelare (barrare la risposta errata):
- a) su proposta del Direttore del CSM che ha in carico il caso
 - b) su richiesta dei familiari
 - c) su richiesta del paziente
 - d) solo su richiesta congiunta di paziente e famigliari



PROVA ESTIMADA

18/1/18 h 9:30

Bla

2



SI PREGA DI BARRARE CON UN X SULLA LETTERA CORRISPONDENTE SENZA APPORRE ALTRI SEGNI; ALTRE INDICAZIONI (es Sì, NO ..) o EVENTUALI CANCELLATURE NON VERRANNO CONSIDERATE

Si ricorda che risposte corrette verranno valutate 2 punti, le risposte lasciate in bianco 1 punto, le risposte sbagliare 0 punti

DOMANDE

- 1) L'incidenza statistica di suicidi è più elevata in individui che sono:
 - a) Genere maschile piuttosto che femminile
 - b) non coniugati piuttosto che divorziati
 - c) coniugati rispetto che vedovi
 - d) giovani rispetto che vecchi

- 2) in assenza di altri sintomi, lo sporadico manifestarsi di automatismi comportamentali e allucinazioni olfattive suggerisce una diagnosi di:
 - a) Disturbo istrionico di personalità
 - b) Psicosi schizofrenica
 - c) lesione del lobo temporale
 - d) Demenza di Alzheimer

- 3) Che cosa è la SUD?
 - a) Durata di malattia non trattata
 - b) Durata di psicosi non trattata
 - c) Psicosi da uso di sostanze
 - d) Disturbo da uso di sostanze

- 4) Si ritiene che la percentuale di madri che sviluppano la depressione post partum sia approssimativamente:
 - a) 0,5-1%
 - b) 10-15%
 - c) 25-30%
 - d) 35-40%

- 5) La ciclotimia si distingue dal disturbi Bipolare per:
 - a) la storia familiare
 - b) l'assenza di cronicità
 - c) la gravità e la durata dei sintomi
 - d) caratteristica personalità preesistente

- 6) La depressione e l'ansia con o senza attacchi di panico si manifestano in circa metà dei pazienti affetti da:
 - a) sindrome di Cushing
 - b) iponatriemia
 - c) iperglicemia
 - d) ipotiroidismo

- 7) Quali tra i seguenti farmaci antipsicotici presenta effetti anticolinergici più marcati?
 - a) Aloperidolo
 - b) Quetiapina
 - c) Olanzapina
 - d) Risperidone

MW A

- 8) Quali dei seguenti farmaci presenta un elevato rischio di teratogenicità se assunto in gravidanza?
- Sali di Litio
 - Valproato
 - Paliperidone Palmitato
 - Aloperidolo
- 9) Nella classificazione delle strutture residenziali psichiatriche elaborata nel 2014 dalla Conferenza Stato Regioni e recepita da Regione Liguria vengono definite come strutture socio-assistenziali psichiatriche:
- Le RSA e le CAUP
 - Le Comunità Terapeutiche
 - Le strutture residenziali Psichiatriche del tipo SPR1
 - Le strutture Residenziali Psichiatriche del tipo SPR3
- 10) Un ricovero in regime di Trattamento Sanitario Obbligatorio si effettua quando :
- è presente uno stato di necessità
 - c'è una richiesta motivata da parte di uno psichiatra della struttura pubblica
 - è stata emessa una ordinanza del Sindaco
 - è stata emessa una disposizione del Giudice Tutelare
- 11) Per quanto tempo è necessario effettuare un emocromo di controllo in soggetti in trattamento con Clozapina?
- 16 settimane
 - 18 settimane
 - 20 settimane
 - 20 settimane e poi una volta al mese sino a che dura il trattamento
- 12) Secondo i dati epidemiologici quale è la prevalenza stimata di disturbi depressivi nella popolazione generale?
- 1%
 - 3%
 - 7%
 - 10%
- 13) Quali tra le seguenti variabili non si correla ad un maggior rischio di comparsa di disturbi mentali gravi nelle fasce giovanili?
- Migrazione di I e II generazione
 - Abusi nell'infanzia
 - Familiarità psichiatrica
 - Genere
- 14) quale tipologia di pazienti psichiatrici vengono ricoverati nelle Residenze per l'Esecuzione di Misure di Sicurezza (REMS)?
- Soggetti incapaci di intendere e di volere
 - Soggetti imputabili e sottoposti a libertà vigilata
 - Soggetti non imputabili e sottoposti a misure di sicurezza
 - Soggetti imputabili sottoposti a misure di sicurezza
- 15) La nomina di un amministratore di sostegno per un paziente affetto da patologia psichiatrica può essere disposta dal Giudice Tutelare (barrare la risposta errata):
- su proposta del Direttore del CSM che ha in carico il caso
 - su richiesta dei familiari
 - su richiesta del paziente
 - solo su richiesta congiunta di paziente e familiari

3



SI PREGA DI BARRARE CON UN X SULLA LETTERA CORRISPONDENTE SENZA APPORRE ALTRI SEGNI; ALTRE INDICAZIONI (es Si, NO ..) o EVENTUALI CANCELLATURE NON VERRANNO CONSIDERATE

Si ricorda che risposte corrette verranno valutate 2 punti, le risposte lasciate in bianco 1 punto, le risposte sbagliare 0 punti

DOMANDE

- 1) L'incidenza statistica di suicidi è più elevata in individui che sono:
 - a) Genere maschile piuttosto che femminile
 - b) non coniugati piuttosto che divorziati
 - c) coniugati rispetto che vedovi
 - d) giovani rispetto che vecchi

- 2) in assenza di altri sintomi, lo sporadico manifestarsi di automatismi comportamentali e allucinazioni olfattive suggerisce una diagnosi di:
 - a) Disturbo istrionico di personalità
 - b) Psicosi schizofrenica
 - c) lesione del lobo temporale
 - d) Demenza di Alzheimer

- 3) Che cosa è la DUP?
 - a) Durata di malattia non trattata
 - b) Durata di psicosi non trattata
 - c) Psicosi da uso di sostanze
 - d) Disturbo da uso di sostanze

- 4) Si ritiene che la percentuale di madri che sviluppano la depressione post partum sia approssimativamente:
 - a) 0,5-1%
 - b) 10-15%
 - c) 25-30%
 - d) 35-40%

- 5) La ciclotimia si distingue dai disturbi Bipolare per:
 - a) la storia familiare
 - b) l'assenza di cronicità
 - c) la gravità e la durata dei sintomi
 - d) caratteristica personalità preesistente

- 6) La depressione e l'ansia con o senza attacchi di panico si manifestano in circa metà dei pazienti affetti da:
 - a) sindrome di Cushing
 - b) iponatriemia
 - c) iperglicemia
 - d) ipotiroidismo

- 7) Quali tra i seguenti farmaci antipsicotici presenta effetti anticolinergici più marcati?
 - a) Aloperidolo
 - b) Quetiapina
 - c) Olanzapina
 - d) Risperidone

[Handwritten signature]

- 8) Quali dei seguenti farmaci presenta un elevato rischio di teratonicità se assunto in gravidanza?
- a) Sali di Litio
 - b) Valproato
 - c) Paliperidone Palmitato
 - d) Aloperidolo
- 9) Nella classificazione delle strutture residenziali psichiatriche elaborata nel 2014 dalla Conferenza Stato Regioni e recepita da Regione Liguria vengono definite come strutture socio-assistenziali psichiatriche:
- a) Le RSA e le CAUP
 - b) Le Comunità Terapeutiche
 - c) Le strutture residenziali Psichiatriche del tipo SPR1
 - d) Le strutture Residenziali Psichiatriche del tipo SPR3
- 10) Un ricovero in regime di Trattamento Sanitario Obbligatorio si effettua quando :
- a) è presente uno stato di necessità
 - b) c'è una richiesta motivata da parte di uno psichiatra della struttura pubblica
 - c) è stata emessa una ordinanza del Sindaco
 - d) è stata emessa una disposizione del Giudice Tutelare
- 11) Per quanto tempo è necessario effettuare un emocromo di controllo in soggetti in trattamento con Clozapina?
- a) 16 settimane
 - b) 18 settimane
 - c) 20 settimane
 - d) 20 settimane e poi una volta al mese sino a che dura il trattamento
- 12) Secondo i dati epidemiologici quale è la prevalenza stimata di disturbi depressivi nella popolazione generale?
- a) 1%
 - b) 3%
 - c) 7%
 - d) 10%
- 13) Quali tra le seguenti variabili non si correla ad un maggior rischio di comparsa di disturbi mentali gravi nelle fasce giovanili?
- a) Migrazione di I e II generazione
 - b) Abusi nell'infanzia
 - c) Familiarità psichiatrica
 - d) Genere
- 14) quale tipologia di pazienti psichiatrici vengono ricoverati nelle Residenze per l'Esecuzione di Misure di Sicurezza (REMS)?
- a) Soggetti incapaci di intendere e di volere
 - b) Soggetti imputabili e sottoposti a libertà vigilata
 - c) Soggetti non imputabili e sottoposti a misure di sicurezza
 - d) Soggetti imputabili sottoposti a misure di sicurezza
- 15) La nomina di un amministratore di sostegno per un paziente affetto da patologia psichiatrica può essere disposta dal Giudice Tutelare (barrare la risposta errata):
- a) su proposta del Direttore del CSM che ha in carico il caso
 - b) su richiesta dei familiari
 - c) su richiesta del paziente
 - d) solo su richiesta congiunta di paziente e famigliari

